



国際ロータリー 第2500地区 第3分区

## Asahikawa Morning Rotary Club

2020～21年度 第1283回 例会報告

例会日：2021年06月17日（木） 時間：7:30～8:30

RI会長：  
ホルガー・クナーク（ドイツ）

例会場： ZOOM 例会  
クラブ活動方針 『未来に紡ぐ』 クラブ会長：木村 和哉 ・ 幹事 坂本

2500地区ガバナー

ランクアップをしよう

松田 英郎（富良野）

おはようございます！



新型コロナのワクチン接種ですが、早い方はすでに接種を終えている方もいらっしゃると思います。私の会社の施設では保健所に集団接種を申し込みましたが、個別の申し込みの方が随分早いということが分かりまして、今月中に数人が打てる予定となりました。昨日の道新で市立病院の副反応についての記事がありましたが、副反応を考えると入居者様の対応やスタッフのお休みの確保等いろいろと考

えなければと思っております。そのことも踏まえまして今日は、薬剤師会会長でもある嵯城会員にお話しいただきたいと思っております。

道新といえば、本日朝刊に桑原会員の記事が載っておりました。後ほどご感想をお願いいたします。

最後に、本来の計画では本日「創立記念感謝の夕べ例会」でしたが、次年度には開催できることを切に願ひまして本日の挨拶とさせていただきます。

以上でございます。本日もよろしくお願ひ申し上げます

会長 木村和哉

### 会務報告

・本日はごさいません。



## 会員の時間

嵯城俊明 会員

# Covid19ワクチン接種の 注意事項

はな保険薬局 嵯城俊明

はな保険薬局

### 1. ワクチン

- ファイザー社ワクチン  
1回目から3週間後の同じ曜日に2回目を接種が標準的  
実際には2回目は3週間後より後に打った方がブースター効果が得られ抗体値が上がる  
抗アレルギー薬服用で抗体価が上がる
- モデルナ社ワクチン  
標準的には1回目から4週間後の同じ曜日に2回目を接種

～1回目と2回目は同じワクチンを接種～ はな保険薬局

### 2. 治療中・服薬中

- 基礎疾患の状態が悪化している場合や全身状態が悪い者  
本来ならば接種後に軽微な副反応のわずが重篤な転帰に十分な免疫を獲得できない
- 免疫不全のある方  
ステロイド・免疫抑制剤内服でも維持量であれば問題なし  
免疫不全はCovid19感染症の重症化リスクであるので打つべき  
免疫不全だけで接種不適当者にはならない

はな保険薬局

- てんかん  
コントロールされていれば問題なし  
接種後の発熱によってけいれん発作が起こしやすい  
→アセトアミノフェン服薬で予防
- 血友病や抗凝固薬であるDOAK（ブラザキサ、リクシアナ、イグザレルト、エリキュース）、ワーファリン服用中  
接種により筋肉内出血のリスクがあるため、接種後2分間以上は強めに接種部位を直接圧迫（皮下出血を避けるために決して揉まない）  
→抗血小板剤服用中は筋肉内出血のリスクはない

はな保険薬局

### 3. 最近1か月以内に発熱

- 麻疹などの特に免疫抑制を認める疾患は十分な免疫を付けるために4週間の間隔
- 中程度の疾患（有意な発熱）は2週間の間隔
- 風邪などの軽症は回復していれば問題なし
- Covid19に罹患したものは隔離を中止するための基準を満たしていれば接種可能。しかしながら再感染リスクは最初の数か月は低いのでワクチン接種を遅らせる選択が出来る
- 接種当日、37.5度以上の発熱は接種不適当者

はな保険薬局

### 4. けいれん（ひきつけ）の既往

- 小児期の痙攣等の既往のみで接種不適当者にはならない
- 現在もけいれん発作が起こる方も病状と体調が安定していれば接種可能

はな保険薬局

### 5. アレルギー既往

- 食物アレルギー、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎（花粉症）、蕁麻疹などのアレルギー体質だけでは接種不適当者にはならない
- 即時型アレルギー反応（15分以内の副反応）の既往のある方は接種後30分間の経過観察
- ラテックスアレルギー、鶏卵アレルギー、ゼラチンアレルギーは接種可能

はな保険薬局

- Covid19ワクチンに含まれるポリエチレングリコール (PEG) に対して重度の過敏症は接種不適合者
  - PEGと交差反応性を持つポリソルベートに対しての過敏症は接種要注意者で医師の判断と接種後30分間の経過観察  
～上記の二つは多くのワクチン、医薬品、ヘアケア製品、スキンケア製品、洗剤に含まれている～
- ポリソルベートを含むワクチン  
：プレベナー13（肺炎球菌）、インフルエンザワクチンHA「第一三共」、ガーダシル（HPV）、エンセバック（日本脳炎）、ロタテック（ロタウイルス）、イモボックス（不活化ポリオ）

はな保険薬局

- Covid19ワクチンの1回目の接種でアナフィラキシー以外の即時型アレルギー反応を起こした方は2回目接種は慎重に判断

即時型アレルギー

：部分的蕁麻疹・紅斑、単回の下痢・嘔吐、咳、眠気

アナフィラキシー（重篤な即時型アレルギー）

：持続する強い腹痛、便失禁、喘鳴、チアノーゼ、呼吸困難、血圧低下、意識消失、尿失禁  
対応：仰臥位で足を高く。エピベン注射

はな保険薬局

- Covid19ワクチンで報告の多い副反応  
：注射部位疼痛、疲労感、頭痛、浮動性めまい、筋肉痛、悪寒、関節痛、発熱

：強く起きやすい要因～2回目、若年、女性

～副反応はワクチンによって免疫が誘導される時に起きるが副反応が起きていない人も免疫獲得されている～

治療薬：解熱鎮痛剤でダメな成分は無い  
推奨はアセトアミノフェン

はな保険薬局

## 6. 筋肉内注射

- 筋肉内注射によって起こる副反応の迷走神経反射は臥床接種で予防。既往者は接種後30分間の経過観察

→迷走神経反射：疲れているとき、睡眠不足のとき、肉体的・精神的ストレスがかかっているときなどに筋肉内注射の強い痛みにより副交感神経の作用で一時的に脳への血流量が減り、失神などとする

はな保険薬局

## 7. 注意事項

- 他のワクチンとの接種間隔は13日以上空ける
- かかりつけ医がいる人はかかりつけ医で予約・接種  
その患者の家族もそのかかりつけ医で予約・接種できる
- 上記の他に集団接種会場で土曜日、日曜日に打てる
- これからは平日でも集団接種会場で受けられるようになる

はな保険薬局

## 国民の6～7割がワクチン接種することで集団免疫獲得

ワクチン接種をしても、しなくても大事なことは感染防止対策です  
「マスク、手洗い、密を避ける、換気」の励行を

はな保険薬局

負けないで!!



はな保険薬局




\* 旭川モーニングRC 出席報告 \*

\* 本日の出席 第1283回 例会 総員 22名  
6月17日分 出席19名 出席率 86.36%

\* 4/22~5/20 は休会のため修正出席はございません。

\* ビジター            ございません  
\* ゲスト              ございません  
\* メークアップ      ございません



**ニコニコ BOX**

本日はございません。



計0名

0円